

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis



El indicador refleja el porcentaje de la población de bovinos que ha sido probada para verificar la presencia de la enfermedad en los animales (reactores a la tuberculosis bovina). Aquellos que resultan positivos son los que se eliminarán en rastros y se procede a la indemnización para el productor. Es importante señalar que en el caso de tuberculosis no existe vacuna para bovinos.

Detalles del indicador

Identificador:	DCE3-042	Tipo del indicador:	Resultado
Nivel del indicador:	Nivel: 3.-Complementario	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Periodicidad:	Anual	Año base:	2007

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2024	Tendencia deseable
-------------------------	------------------	-----------	--------------------

12.7

Porcentaje

13.57



Ascendente
(Conviene a Jalisco que aumente)

Reportado al:
31/12/2023

Fuente: Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Estado de Jalisco, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Cifras preliminares 2023.


Nota: Datos preliminares correspondientes de enero 2023 a septiembre 2023.

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis

Valores históricos

Año	Valor
2023	12.7
2022	13.36
2021	14.6
2020	13.51
2019	10.9
2018	9.9
2017	15.2
2016	11.23
2015	12
2014	11.57
2013	9.87
2012	12.47
2011	13.91
2010	11.77
2009	17
2008	17.8
2007	17.9

Gráfica de avance



Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Desarrollo y crecimiento económico

Programa: 3.- Desarrollo y crecimiento económico Temática: 15.- Desarrollo rural

Objetivo de desarrollo: Incrementar la tecnificación y el valor agregado de las actividades productivas primarias en el estado destacando la conservación de los recursos naturales y la competitividad.

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis

Metodología

- Metodología: Los médicos veterinarios aprobados muestrean a los animales en campo. Detectan la presencia de la enfermedad y se instruye al productor para el envío del animal al rastro. El rancho se cuarentena.
- Fórmula: $PCT = (PBA / PB) * 100$
- Variables: PCT=Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis PBA=Población bovina analizada para detectar tuberculosis PB=Población total bovina

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1124>